

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十九 明 周王朱橚 撰

消渴門

虛熱渴

附論

夫五臟六腑皆有津液也若五臟內虛而生熱者熱氣在內則津液竭少故為渴也夫渴者喜水其人必煩目眩背寒而嘔皆因內虛故也診其心脈滑甚者為喜渴也人因勞傷腑臟或大病後未復氣血不足陰虛內

熱熱則津液燥少故渴而飲引飲不能多多則腹滿不
消氣虛不勝於水故也

腎瀝湯

出聖濟
總錄

治臟氣不足內燥發渴

生乾地黄

洗剉
剖

澤瀉

去

遠志

心

桂

心

去粗

當歸

切
焙

龍骨

甘草

炙
剉

五味子

赤茯苓

去
皮

芎藭

人參

黃芩

去黑
心

麥門冬

去心
焙

各二兩

右粗搗篩每用羊腎一隻去筋膜切開先用水一盞

半煮羊腎一盞去腎入藥末三錢再煎七分去滓溫

服不拘時

黃耆湯

出聖濟
總錄

治氣虛燥渴引飲

黃耆

細劉

枯樓根

劉

麥門冬

去心
焙

赤茯苓

去黑
皮

人參

甘草

炙劉

黃連

去須

知母

劉焙

生地黃

焙

兔絲子

酒浸一
宿焙乾

肉蓯蓉

酒浸一宿去
皺皮劉焙

石膏

煨赤各
一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

木香湯

治虛熱渴飲水不已心腹脹滿

木香

枳殼

去瓢
麩炒

芍藥

檳榔

生劉各
半兩

桑根白皮

劉黃耆

細劉

草豆蔻

去皮

枇杷葉

拭去毛炙

黃連

去須各二兩

桂心

去粗皮一兩

人參

一兩半

時

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

鹿茸丸

治虛渴煩燥不利

鹿茸

去毛塗酥炙

黃耆

細劉

人參

土瓜根

山茱萸

杜仲

去粗皮切炒

桑螵蛸

炙各一兩

枯樓根

兔絲子

酒浸一宿

別搗研

雞肫脰

十枚炙乾

肉蓯蓉

酒浸一宿去皮

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九酒下不拘時溫服

人參湯

治虛渴飲水過多身體浮滿

人參

黃耆

細研各二兩

旋覆花

桑根白皮

剉各二兩紫

蘇葉

犀角

鎔屑各半兩

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

湯去白焙五

味子

去梗澤瀉

各一兩半

右咬咀每服三錢水一盞半煎一盞去滓溫服不拘

時

黃耆丸

治虛燥渴不已

黃耆

細剉

五味子

各二兩

烏梅

茯苓

去木各一兩半

附子

炮製

去皮臍大者二枚

澤瀉

酸石榴皮

生乾地黄

焙各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九漿水

下不拘時服之

人參湯

出聖濟總錄

治消渴飲水無節

人參

二兩

五味子

大腹皮

各三兩

赤茯苓

去黑皮

桑根

白皮

剉炒

黃耆

細剉各一兩半

芍藥

黃芩

去黑皮

葛根

剉各一兩

枳殼

去瓢麩
炒三分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

黃連丸

出聖
惠方

治熱渴不止心神煩燥

黃連

枯樓根

各等
分

右為末以麥門冬去心煮熟爛研和九梧桐子大每

服煎小麥湯下三十九食後服

雞蘇丸

出危
氏方

治病後虛羸發渴

右雞蘓丸以北五味子煎湯吞下後服安腎丸

雞蘓丸方

見諸血門鼻衄血類安腎丸方見虛勞門虛勞類

薏苡仁湯

出聖濟總錄

治虛不止渴

薏苡仁

五味子

各一兩半

覆盆子

生乾地黄

剉焙

杞

各一兩

紫蘓莖葉

黃耆

剉細

木通

各一兩

白茯苓

去黑

皮三兩

兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

清心蓮子飲

出危氏方

治心中蓄熱時常煩燥因而思慮

勞力憂愁抑鬱是致小便白濁或有沙膜夜夢泄遺
瀝澁痛便赤如血或因酒色過度上盛下虛心火炎
上肺金受尅口舌乾燥漸成疳渴睡卧不安四肢多
倦怠男子五淋婦人帶下赤白及病後氣不收斂陽
浮於外五心煩熱藥性溫平不冷不熱常服清心養
神秘精補虛滋潤腸胃調順血氣

黃芩

去心半兩

黃耆

去蘆案炙

石蓮肉

去心

白茯苓

去皮

人參

去蘆

各七
分 麥門冬 去心 甘草 地骨皮 車前子 去土炒各半兩

右剉散每服三錢麥門冬十粒去心水一盞煎取八分去滓水中浸冷空腹服發熱加柴胡薄荷煎

茯苓湯

出聖惠方

治心脾熱渴不止小便難宜服此

赤茯苓

一兩 蘆根 剉一兩

黃芩

一兩 知母

一兩 桔樓根 一兩 瞿

麥穗

一兩 麥門冬 去心一兩

甘草

一兩 炙

木通

剉一兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時溫服

地黃丸

出聖濟總錄

治臟虛舌本燥渴引飲不已

熟乾地黃

剉焙

山茱萸

山茅

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

去皮黑

附子

炮製去皮臍各一兩

桂心

去粗皮一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九溫水下

不拘時

天竺黃散

出聖惠方

治熱渴

天竺黃

一兩細研

黃連

一兩去須

茯神

一兩

甘草

一兩炙微赤剉

川芎

硝一兩犀角屑

栝樓根

一兩

川升麻

一兩

右為散入研了藥令勻每於食後煎淡竹葉湯調下

一錢

黃耆散

出聖惠方

治脾胃中熱煩渴不止

黃耆

一兩對

茯苓

一兩

生乾地黄

一兩

地骨皮

一兩

梔子

一兩

麥門冬

一兩去心

黃芩

一兩

甘草

半兩炙微赤對

右為散每服四錢水一盞入生薑半分淡竹葉二七

片煎至六分去滓不計時候溫服

猪肚黃連丸

出聖惠方

治脾胃熱渴不止羸瘦困乏

猪肚

一枚
淨洗

黃連

三兩
去須
別搗為末

枯樓根

一兩

白梁米

一合
淨淘

柴胡

一兩
去苗

茯苓

一兩
知母
一兩

麥門冬

二兩
去
心焙

右為末先將黃連末及米入肚內縫合蒸爛熟砂盆

內研如膏入藥末和令勻丸如梧桐子大不計時以

清粥飲下三十丸

知母散

出聖
惠方

治心脾實熱煩渴不止

知母

一兩
兩 蘆根

一兩
半剉

枯樓根

一兩
兩

麥門冬

一兩
去心

黃芩

三
分

川大黃

一兩
剉
碎微炒

甘草

半兩
炙
微赤剉

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時
候溫服

赤茯苓散

出聖
惠方

治脾胃中熱引飲水漿渴不止

赤茯苓

枯樓根

黃芩

麥門冬

去心

生乾地黃

知母

各一
兩

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分小麥半合
淡竹葉二七片煎至五分去滓不計時候溫服

人參散

出神
効方

治身熱頭痛或積熱黃瘦或發熱惡寒

畜熱寒戰或腸熱嘔吐燥熱煩渴瀉痢或目赤口乾
或咽喉腫痛或風熱昏眩或蒸熱虛汗肺痿勞嗽一
切邪熱脾胃肺腎不調及真陰損虛並宜服之

石膏

一兩

寒水石

一兩

滑石

四兩

甘草

一兩

人參

半兩或無亦得

右為細末每服二錢溫水調下或冷水亦得早晚食
後兼服梔子金花丸一名既濟解毒丸

茯神丸

出聖惠方

治心脾壅熱煩渴口乾宜服此

知母

枯樓根

各一兩

麥門冬

二兩去心焙

黃連

茯神

各一

兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時

以清粥飲下三十丸

人參竹葉湯

出千金方

治熱病後虛熱渴四肢煩疼

葛根

一斤人參

甘草

各一斤

竹葉

一把

右咬咀水一斗五升煮取五升渴飲之日三夜一

龍硃散

出聖惠方

治心肝熱渴面赤口乾宜服之

馬牙硝

半斤

川芒硝

四兩

寒水石

四兩

石膏

三兩

右件藥以水五升浸三日用銀器中煎至水盡後去寒水石及石膏陰乾別入龍腦半兩硃砂一兩同研為末不計時候蜜水調下一錢兼治喉痺腫痛甚妙

石膏湯

出聖惠方

治熱極渴不止

麥門冬

一兩去心

石膏

二兩

蘆根

一兩

右件為散每服半兩水一盞煎至五分去滓不計時

候溫服

黃連膏

出聖惠方

治熱渴不止心神煩燥宜服此

黃連

五兩去須
搗為末

地黃汁

一蜜五
兩合

右件藥於銀器中以慢火煎成膏收於瓷器中每於

食後煎竹葉麥門冬湯計彈子大服之

黃連散

出聖
惠方

治心肺熱煩渴口乾宜服之

豉

一兩
合黃連

一兩
去須

右為散每服半兩水一大盞煎至五分去滓每於食

後溫服

麥門冬湯

出聖
惠方

治證同前

黃連

半兩
去須 麥門冬 一兩
去心

右為散每服半兩水一盞煎至五分去滓每於食後

溫服

浮萍丸

出聖
惠方

治熱渴不止心神煩燥

浮萍

右取水洗曝乾為末以牛乳汁和丸如梧桐子大每服三十九不計時候以粥飲下

麥門冬丸

出聖濟
總錄

治臟虛乾燥發渴飲水

方見本門
痛渴口乾

燥類

參朮白朮散

出如宜方

治病後脾虛津液燥或有餘熱虛

渴

白扁豆

姜汁浸炒去皮

茯苓

山藥

人參

甘草

蓮

肉

砂仁

桔梗

薏苡仁

炒各二兩

右為末加烏梅天花粉煎上膈熱宜雞蘇丸

治中熱酒渴疾

出本草

生葛

右冬月取以水中揉出粉澄成揉先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其體甚韌以蜜湯中拌食之擦少生薑尤佳多食行少便亦能使人利

治虛熱渴

出本草

葎草

右以煮汁及生汁服之

治熱渴心悶

出本草

地漿

右水一大盞掘地作坎以水沃其中攪令濁俄頃取飲之

解熱渴

出本草

酢漿草

右取食之

治虛熱渴

出本草

桃膠

右以如彈丸含之佳

治下虛上熱而渴

出永類
鈴方

菝葜根

右每服一兩水二盞半煎減半日三服渴減只二服

治熱渴心悶

橘皮 甘草

右等分煮飲時服嚥之勿煩使多喫但以熱土及熬
熱灰土壅其臍上為佳以溫湯喫飲之亦可

治熱渴心悶

麵

右取一兩以溫水一中盞攪和服之

胃熱渴

附論

夫胃氣實則生熱熱則土氣內燥津液不通咽膈煩滿
故渴而引飲內經謂脾氣熱則胃乾而渴蓋臟貞濡於
脾脾合為胃行其津液者也脾既受熱津液不濡於胃
胃乾則渴不止也

黃連湯

出聖
惠方

治脾胃中熱煩渴身漸消瘦宜服此

黃連

一兩
去須

川升麻

一兩
兩

麥門冬

一兩
去心

黃芩

一兩

桔樓根

一兩知母

一兩

茯苓

半兩

梔子仁

一兩

甘草

一兩
微炙

石膏

二兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

茯苓湯

出千
金方

洩熱止渴治胃腑實熱引飲常渴

茯苓

二兩
作茯苓

桔樓根

生麥門冬

各五
兩

姜薤

知母

各四
兩

生地黃

六兩

小麥

二升

大棗

二十
枚

淡竹葉

升

右哎咀水三斗煮小麥竹葉取九升去滓下藥煮取
四升分四服服時不問早晚但渴即進非但止胃渴
通治渴患熱者

枸杞根湯

出聖濟
總錄

治胃乾渴不止飲水

枸杞根

枯樓根

麥門冬

生去
心

黃連

去須各
一兩半土

瓜根

乾
者知母

車前子

去土各
一兩

右剉如麻豆每服五錢水一盞半入生地黃半兩切
同煎至八分去滓溫服日三

開胃解熱渴飲子

出廣南四時攝生論

大黃

甘草

各半兩

半夏

十兩

生薑

三兩

好棗

五七兩

右用水一大銚同煎至八分旋取溫服之不拘時

枯樓湯

出聖濟總錄

枯樓根

生薑

各五兩

生麥門冬汁

蘆根

切二升

茅

根

切三升

右咬咀水一斗煮取三升分三服

茯神湯

出聖濟總錄

治胃渴引飲泄熱

茯苓

去木 二兩

枯樓根

麥門冬

去心 各五兩

知母

剉 姜豉

各四

兩

右粗搗篩先水三盞淘小麥一匙淡竹葉五十片洗切同煮至一盞半去滓下藥末四錢棗三枚擘破生地黃半分同煎至一盞去滓溫服日三

甘草湯

出聖濟總錄

治胃熱乾渴

甘草

炙 剉

枯樓根

各二兩

麥門冬

去心 焙 二分

半夏

湯先去滑七徧

曝乾豉炒

二兩半

右粗搗篩水二盞淘小麥半合煎至盞半去麥下藥末五錢大棗三枚擘破生地黃半錢生薑一棗大拍破再煎至八分去滓溫服日再服

枯樓根湯

出聖濟總錄

治胃中乾渴

枯樓根

三兩 焙二

甘草

炙 剉 人參 各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓下白蜜少許攪勻不拘時候服日可數服

黃耆湯

出聖濟總錄

治胃乾渴

洗心飲子

出廣南四
時攝生論

甘草

芍藥

山梔

杏仁

去尖
研入

右等分為散每服三錢水二盞煎至八分夜後溫服

冷湯

出廣南四
時攝生論

甘草

二十
炮

大棗

五
簡

竹葉

十四
片

熟附子

末少
許

人參

少
許

右微剉碎用水煮放冷時時服之

治胃中熱痞渴利小便

出本
草

陳粟米

右炊飲食之

暴渴 附論

夫暴渴緣熱甚腠理開汗大泄而津液暴燥故渴而飲引小便利者不能為害若三焦不和心肺壅熱胃中乾燥渴而小便不利者須變飲證不可不察喜渴者由心熱也心主於便汗便汗出多則腎中虛燥故令渴也凡夏月渴而汗出多則小便少冬月不汗故小便多此皆是平人之候名曰暴渴也

蘆根散

出聖惠方

治暴渴飲水多或乾嘔

蘆根

一兩半剉

人參

半兩去蘆頭

百合

三分

麥門冬

一兩去心

桑根

白皮

三分剉

黃耆

三分剉

赤茯苓

三分

黃芩

三分

葛根

三分炙微

赤剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分淡竹葉二十片煎六分去滓不計時候溫服

地骨皮湯

出聖惠方

治脾虛熱暴渴不已

地骨皮

枯樓根

黃連

麥門冬

去心焙

黃芩

去黑

心各一兩 茯神去木 遠志去心 甘草炙焙 石膏碎二

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

蘆根湯

出聖惠方

治暴渴煩熱

蘆根

剉

麥門冬

去心焙

桔樓根

地骨皮

各兩

白茅

根

剉

石膏

碎各二兩

人參

三分

甘草

炙半兩

右咬咀每服五錢水一盞半生薑一棗大拍碎小麥

半合竹葉二七片煎至八分去滓食後溫服

桑根白皮湯

出聖濟總錄

治暴渴飲水不止頭面虛浮

桑根皮

剉

麥門冬

去心焙

石膏

碎各二兩

赤茯苓

去黑皮

黃

芩

去黑心

枯樓根

各一兩半

梔子仁

半兩

土瓜根

一兩

右咬咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不

拘時

枯樓根散

出聖惠方

治暴渴心神煩悶體熱食少

枯樓根

一兩

蘆根

剉一兩

麥門冬

去心一兩

知母

一人

參

去蘆頭

地骨皮

一兩

黃芩

一兩

甘草

一兩炙

微赤切

右為散每服五錢水一盞入生薑半分小麥半合竹葉二十七片煎至五分去滓不拘時候溫服

茯苓湯

出聖濟總錄

治心脾壅滯暴渴引飲

赤茯苓

去黑皮

澤瀉

白朮

黃連

桂心

去粗皮

甘草

草

灸對各一兩

大黃

生用半兩

右咬咀每服三錢水一盞半入小麥半匙煎至一盞去滓不拘時候溫服

地骨皮湯

出聖濟總錄

治暴渴

地骨皮

桔樓根

各一兩半

黃連

土瓜根

麥門冬

去心焙

車前子

各一兩

知母

焙半兩

右咬咀每服三錢水一盞半入生地黃半分切煎至

八分去滓溫服不拘時

黃連散

出聖濟總錄

治心脾壅盛暴渴飲水

黃連

葛根

剉炒四兩半

大黃

剉炒半兩

枇杷葉

拭去毛炙一兩

麥

門冬

去心焙一兩半

右搗羅為散每服二錢溫水調下不時服

黃耆湯

出聖惠方

治暴渴飲水過多煩渴不止

黃耆

剉

枯樓根

各一兩

赤茯苓

去黑皮

甘草

炙各半兩

麥門

冬

去心焙一兩半

右咬咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時或為末煎竹葉湯調下

枳實湯

出聖濟總錄

治內熱暴渴不止

枳實

去瓤麩炒

茯苓

去木

葛根

剉

石膏

各二兩半

右咬咀每服三錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不

拘時

麥門冬湯

出聖濟總錄

治暴渴煩燥飲水

麥門冬

去心焙二兩

知母

焙三兩

凝水石

一兩半

青竹茹

如雞

子二塊
碎切

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

烏梅散

出聖濟總錄

治虛燥暴渴

烏梅肉

焙一兩半

麥門冬

去心焙一兩半

生乾地黄

焙一兩

甘草

灸一
兩

右為散每服二錢溫熱水調下不拘時

柴胡散

出聖
惠方

治暴渴心煩口舌乾燥

柴胡

去
苗

烏梅肉

炒各
二兩

甘草

灸一
兩

麥門冬

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服不

拘時

黃連散

出聖
惠方

治暴渴心神煩悶口舌乾燥

枇杷葉

一兩拭去
毛炙微黃

蘆根

三兩
剉

甘草

三分灸
微赤剉

黃連

一兩

去須

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓每於食

後溫服

赤茯苓散

出聖惠方

治胸膈氣壅滯暴渴不止

赤茯苓

一兩

訶梨勒皮

三分

龍腦

一錢

人參

三分

去蘆頭

右為散入龍腦研令勻不拘時候以粥飲下一錢

烏梅湯

出十便良方

治暴渴心神煩悶口舌乾燥

烏梅肉

七枚微炒

生薑

一分

白沙糖

三分

右件藥以水二大盞煎至一盞二分去滓分三服食

後溫服

酥蜜煎

出聖惠方

治暴渴除煩熱

酥蜜

五合

白蜜

五兩

川芒硝

二兩

右件藥於銀器中以慢火熬成膏收甕中不計時

候服半匙嚥津

秦朮湯

出聖惠方

治暴渴咽燥口乾引飲

秦朮

去土苗二兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘
時一方生薑半分煎

治胸膈氣壅滯暴渴不止

蘿蔔

二枚

右取大者搗爛取汁入蜜二合生薑半兩取汁酥一
兩令勻渴即旋少飲之

麥門冬散

一名蘆根湯

治暴渴煩熱不退少得睡卧

方在本類

治大渴熱中暴疾

出本草

邪蒿

右煮令熟和醬醋食之

久渴 附論

夫消渴之病於腎水不足下焦虛熱若病久愈者邪熱
蘊積榮衛澁滯精血衰微病多傳變宜加慎忌凡忌有
三一飲酒二房室三鹹食及麵又消渴經百日以上者
當忌灸刺則瘡上漏水變成癰疽疾

澤瀉丸

出聖惠方

治腎虛燥久消渴不止

澤瀉

肉蓯蓉

酒浸切焙

五味子

禹餘糧

煨醋淬三七偏

巴

戟天

去心

當歸

切焙

地骨皮

洗焙各一兩

磁石

煨醋淬二七偏

人參

赤石脂

韭子

白龍骨

甘草

炙焙

牡丹皮

各一兩一

分生乾地黄

焙二兩半

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸以牛乳汁

下不拘時候服之

麥門冬丸

出聖濟總錄

治瘡渴

麥門冬

去心焙

赤茯苓

去黑皮

黃連

去須

黃芩

去黑心

石膏

煨姜 藟 人參 升麻 龍膽 枯樓根 枳殼

去麤 生薑切 焙 枸杞根皮 洗切各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九漿飲下

不拘時

腎瀝湯

出聖濟總錄

治久疝渴飲水不絕

遠志

去心

人參

澤瀉

熟乾地黄

焙

桂

去粗皮

當歸

切 赤茯苓

去黑皮

芎藭

各二兩

五味子

麥門冬

去心 焙二

兩半

右咬咀每服五錢水三盞先煮羊腎一具取二盞去
腎入藥并大棗三枚擘破生薑半分切同煎取一鍾
半去滓溫服不拘時

臍脰散

出聖濟
總錄

治久渴旬日見效

雞臍黃皮

雞腸

各五具
炙乾

白龍骨

鹿角膠

炙
燥

白石脂

漏蘆

去蘆頭炙
各一兩

土瓜根

三兩

黃連

去須

苦參

牡蠣粉

各二兩半

桑螵蛸

二七箇

右為散每服一錢米飲調下日三夜一

白石英丸

出聖濟總錄

治消渴經年飲水不止

白石英

別研

芒硝

別研

凝水石

別研各二兩

赤茯苓

去黑皮

人

參地骨皮

澤瀉

苦參

甘草

炙剉各三兩

麥門

冬

去心焙三兩

右除別研外搗羅為末合研勻煉蜜如梧桐子大每服三十丸溫水下不拘時服

升麻丸

出聖濟總錄

治消久渴不止

升麻黃芩

去黑心

麥門冬

去心焙各五兩

栝樓根

七兩

生地

黃焙三兩 苦參八兩 黃連去須 黃蘗去粗皮剉 人參三兩

右為末生牛乳汁和衆手連丸如梧桐子大暴乾每

服三十九粟米飲下不拘時候服加至五十九

苦參丸

出聖濟總錄

治久瘡渴飲水不絕

苦參

二兩

黃連

去須

枯樓根

知母

焙

麥門冬

去心焙

人

參

牡蠣

煨

黃耆

剉

生乾地黃

焙各

一兩

右為末以牛乳汁和衆手連丸如梧桐子大每服三

十九漿水下不拘時

水銀丸

出聖濟總錄

治久瘡渴經年飲水無度

水銀 鉛

醋淬各半兩

柳絮礬

三分先細研次入水銀并鉛三味和研勻以瓷

盒盛外用帛筋泥固濟安灰內養半日取出候冷再細研

鉛丹

研

豉

炒

白殭蠶

炒

黃連

去須各半兩

右四味為末與前三味再研勻用糯米糊丸如梧桐子大每服二十九溫水空心日午夜卧服

竹葉湯

治積年瘡渴好食冷物

青竹葉

剉碎

白茯苓

去黑皮

地骨皮

剉

枯樓根

各一兩

桂去粗皮甘草炙剉各半兩麥門冬去心焙二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半入小麥一撮煎至八分

去滓食後溫服日二

黃連散

出聖濟總錄

治久瘡渴內燥引飲不已

黃連

去須

白石脂

研各一兩半

鉛丹

研一兩

枯樓根

三兩

右為細散每服二錢漿水調下日三服

楮葉散

治瘡渴疾久不愈

蝸

焙乾半兩

蛤粉

龍膽

去土

桑根白皮

剉炒各一分

右為散每服一錢煎楮葉湯調下不拘時

莎草根散

治瘡渴累年不愈者

莎草根

去毛
一兩

白茯苓

去黑皮
半兩

右為散每服三錢陳粟米飲調下不計時

葵根湯

出聖濟
總錄

治久瘡渴飲水不絕

經霜冬葵根皮

不拘多少
細切焙

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

黃連丸

出聖
惠方

治瘡渴久不瘥體瘦心煩

黃連

半兩
去須

黃耆

半兩
剉

梔子仁

一分

苦參

半兩
剉

人參

二分

去蘆
頭

葳蕤

一分

知母

二分

麥門冬

一分
心焙

桔樓根

半兩

甘

草

一兩
微赤切

地骨皮

一分

赤茯苓

一分

生乾地黃

一分

鐵粉

研

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計

時以粥飲下三十丸

黃連丸

出聖
惠方

治瘡渴久不止心神煩壅眠卧外不寧

宜服此

黃連

皂莢樹鷺

微炒

苦參

白石英

研各一兩

知母

枯樓根

赤茯苓

各二兩

金箔

銀箔

各五十片

右為細末入石英金銀箔相和研勻煉蜜和搗三五

百杵丸如梧桐子大每服不拘時候煎小麥湯下三

十丸竹葉湯下亦得

黃連丸

出千金方

治消渴久不瘥喫食少心神煩亂宜服

黃連

一斤去須

生地黃

五斤爛研布絞取汁

右絞地黄取汁浸黃連出曝燥復納汁中令汁盡乾
搗末蜜和丸如梧桐子大每服二十九日三食前後
無蜜可為散以酒服方寸匕一方清粥飲下

消渴飲水過度

附論

夫消渴飲水過度者由腎虛心熱三焦不和上熱下冷
故也凡人好食熱酒炙肉或服乳石壅滯之藥熱毒在
內不得宣通關脈閉塞血脈不行熱氣蒸於臟腑津液
枯竭則冷心肺煩熱咽喉乾燥故令渴不止而飲水過

度也

羚羊角散

出聖惠方

治痄渴飲水過多不止心神恍惚卧

不安穩

羚羊角屑

知母

黃耆

剉

枯樓根

麥門冬

去心

茯神

地骨皮

人參

去蘆頭

防風

去蘆頭

酸棗仁

各三

分微炒

甘草

半兩炙微炒

石膏

一兩半

黃芩

半兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分淡竹葉

二七片小麥半合煎至五分去滓每於食後溫服

麥門冬丸

出聖濟總錄

治消渴飲水過多

麥門冬

去心焙

栝樓根

大麻仁

研

大黃

蒸二度切焙

苦

參粉

鐵粉

各三兩

黃芩

去黑心

澤瀉

各一兩半

龍齒

研土

瓜根

知母

焙

石膏

研各二分

銀箔

三百片和龍齒石膏入研

雞肫

胫黃皮

炙七枚一兩半

右為散末煉蜜丸如梧桐子大每食後煎生地黃湯

下二十五丸日二服

土瓜根丸

出聖惠方

治消渴飲水過度煩熱不解心神恍

惚不問日夜飲水無度此藥主之不可輕用其效如神
可通仙術師云止渴在第三味住水神妙不可輕用
人參 知母 天花粉 苦參 宣連 扁豆
浮萍 麥門冬 黃丹 許少
右八味各一兩加黃耆一兩為細末每服一錢新汲
水調下妙不可言

鐵粉丸 治瘡渴飲水過度渴尚不止口舌乾燥心
神煩亂坐卧不安鎮心止渴

鐵粉

細研

苦參

牡蠣

土瓜根

各一兩

黃連

麥門

冬

各二兩
去心焙

金箔

銀箔

各五片
細研

栝樓根

二兩

右為末入研了藥都研令勻煉蜜和搗三五百杵九

如梧桐子大不拘時候以清粥飲下三十丸

麥門冬丸

治消渴飲水不止

麥門冬

去心焙

升麻

黃連

去須

黃蘗

去粗皮

黃芩

去黑心各

五兩

生乾地黄

焙

人參

各三兩

栝樓根

七兩

苦參

八兩

右為末以牛乳和丸如梧桐子大每服三十九丸食前

米飲下

黃丹散

治瘡渴飲水過多煩熱不解

黃丹

胡粉

各一兩

枯樓根

石膏

各一兩

澤瀉

白

石脂

各三兩

甘草

半兩炙微赤剉

麥門冬

去心焙二兩

右為末不計時候每服一錢以清粥飲調下

麥門冬散

治瘡渴日夜飲水過度口乾小便數

麥門冬

去心

枯樓根

知母

黃耆

各一兩剉

甘草

半兩炙微

赤牡蠣

一兩半燒為粉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

竹葉湯

治痾渴飲水不輟多至數斛

甘竹葉

切

大麻仁

炒

赤秫米

各一升
淘淨

白茯苓

去黑皮一

兩

薤白

二兩切

鹿角

四隻湯浸去皮細研肉

右剉分作八服每服先水三盞煎麻仁竹葉取二盞去滓澄清入諸藥鹿角又煎取一盞微微飲之渴止為度

黃連散

治痢渴飲水過多不知足限

蜜陀僧

細研

蠟面茶

黃連

去須

滑石

枯樓根

各半兩

右為散每服一錢不計時候以清粥調下

楮葉丸

治痢渴減食飲水不休

乾楮葉

炒

桑根白皮

剉炒

白茯苓

去黑皮

人參

定粉

各一兩

右為細末取楮汁和丸如梧桐子大每服二十九煎

人參湯下不計時

又方 治瘡渴飲水過多不知足限

黃丹

一分 枯樓根

半兩

檳榔

一分 末

菜豆

一分 兩

右都研令勻用麵三兩相和作餅鈹用生薑蔥薤白
酢汁煮熟和汁溫食

又方 治證同前

黃連

去

枯樓根

蜜陀僧

細研

人參

去蘆頭

各半兩

右為末入蜜陀僧研令勻每於食後以溫漿水調下

漢防已散

治瘡渴飲水過多不知足限

枯樓根

漢防已

黃連

去須黃丹

各半兩

右為散入黃丹研令勻每服於食後以溫水調下一

錢

絳雪散

治瘡渴飲水無度小便數者大有神驗

黃芩連

黃丹

漢防已

枯樓實

等分

右為末每服二錢溫漿水調下臨卧併三二服即妙

鉛黃丸

一名枯樓根丸

治瘡渴即飲水過多不知足限

鉛丹

黃連

去須各半兩

乾葛粉

枯樓根

各三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大冷水下二十丸

葛根丸

治消渴日飲水數斗不止

葛根

剉

枯樓根

剉

附子

炮製去皮臍

鉛丹

炒令紫研各一兩

右為散入鉛丹同研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九煎茅根湯下日三次飲亦得春夏去附子

枯樓根丸

治消渴飲水不止

枯樓根

剉

黃連

須

知母

焙

麥門冬

去心各五兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九米飲下

神效散

治渴疾飲水不止

白浮石

蛤粉

蟬殼

各等分

右為末用鯽魚膽七箇調三錢服不拘時神效

古方驗錄論消渴有三種一者渴而飲水多小便數似脂麩片甜者消渴病也二者喫食多不甚渴小便少似有油而數者消中病也三者渴飲水不能多便腿腫腳先瘦少陰痿弱小便數此腎病也特息房勞千金云消渴病所慎者有三一飲酒二房室三鹹食及麵能慎此

不須服藥亦自可消渴之人愈與未愈當須慮患大癰
必於骨節間忽發癰疽而卒予親見友人邵任道患渴
數年果以癰疽而死唐祠部李郎中論消渴者腎虛所
致每發則小便甜醫者多不知其疾故古今亦闕而不
言洪範言稼穡作甘以物理推之淋飭醋酒作脯法須
臾即皆能甜也足明人食之後滋味皆甜流在膀胱若
腰腎氣盛則上蒸精氣則下入骨髓其次以為之膏其
次以為血肉也其餘則為小便故小便色黃血之餘也

騷氣者五臟之氣鹹潤者則下味也腰腎既虛冷則不能蒸於穀氣則盡下為小便故味甘不變其色清冷則肌膚枯槁也猶如乳母穀氣上騰皆為乳汁消渴病者下泄為小便皆精氣不實於內則小便數瘦弱也又肺為五臟華蓋若下有暖氣蒸則肺潤若下冷極則陽氣不能升故肺乾則渴易於否卦乾上坤下陽無陰而降陰無陽而不升上下不交故成否也譬如金中有水以火煖之其金以板覆之則煖氣上騰故板能潤也若

無火力水氣則不能至此板則終不得潤也火力者則是腰腎強盛常須煖補腎氣飲食得火力則潤上而易消亦免乾渴也故張仲景云宜服腎氣八味丸此疾與脚氣雖同為腎虛所致其脚氣始發于三月盛於五六月衰於七八月凡消渴始發於七八月盛於十一月十二月衰於二三月其何故也夫脚氣壅疾也消渴宣疾也春夏陽氣上故壅疾發則宣疾愈秋冬陽氣下故宣疾發則壅疾愈也審此二者則疾可理也猶如善為政者

寬以濟猛猛以濟寬隨事制度爾仲景云足太陽者是膀胱之經也膀胱者腎之腑小便數此為氣盛氣盛則消穀大便梗衰則為瘠渴也男瘠渴飲一斗小便亦得

一斗宜服八味腎氣丸

方見瘠渴類

拔藝飲

治瘠渴飲水無休

拔藝

劉炒

湯瓶內釀

各一兩

烏梅

二兩并核搥碎焙乾

右粗搗篩每服二錢水一盞瓦器煎七分去滓稍熱

細呷

又方 治消渴飲水過多不知足限

栝樓根

一兩

黃連

二兩 去須

甘草

一兩 炙 微赤剉

右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓每於食

後溫服

又方

地骨皮

一兩

甘草

三分 炙 微赤剉

桑根白皮

三兩 剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓每於

食後溫服

生津丸

治消渴飲水日夜不止

青蛤粉

白滑石

右研為細末用黃顙魚涎和為丸如梧桐子大每服
三十丸煎陳粟米飲下不拘時

神應散

治消渴飲水不休

滑石

研

寒水石

研各

半兩

右研為散用生雞子一枚鑿破去黃留青調和藥末
令如稠膏却納在雞殼內以帛封口用鹽泥固濟曝

乾灰火內燒令通赤放冷去土并殼取藥研令絕細
為度每服食大人二錢小兒半錢米飲調下

玉壺丸

治瘡渴飲水不度

人參

枯樓根

各等分

右末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九麥門冬湯下
沃焦散 治瘡渴飲水無度

泥鱗魚

千頭陰乾去頭尾
燒灰細研為末

乾荷葉

細研
為末

右等分每服各二錢新水調下遇渴時服日三候不

思水渴即止

治瘡渴飲水過甚并小兒渴疾方

黃狗膽

一枚 獺猪膽一枚

右件狗膽併入猪膽內陰乾丸如梧桐子大每服以麝香湯下二丸小兒半丸

黃連丸

治渴疾飲水不止

黃連

不以多少

右為末入猪肚內蒸爛同搗丸如梧桐子大每服三

四十九飯飲下一方用猪膽汁和勻蒸食

枯樓根散

治瘡渴飲水不止

熟乾地黄 生乾地黄 芎根 枯樓根

右件各等分焙乾為細末每服二錢溫米湯飲下不

拘時候

文蛤散

治瘡渴欲飲水而不止者

文蛤

即五倍最能回津本草在海蛤文下甚失其性識者當自知之

右為末以水飲任調下方寸匕不以時

三消丸

一名瓜連丸

治渴疾飲水不止骨蒸

黃連

細剉用冬瓜汁浸一宿晒乾凡七次

右為末用冬瓜自然汁搜成膏子陰乾為末再用冬瓜汁作餅如此七遍為末用冬瓜汁為丸如梧桐子大每服三四十丸冬瓜汁煎大麥湯吞下尋常渴只一服炒米飲亦可

甘露散

治渴疾飲水不止

乾猪脬

十箇

右剪破出却氣去却繫著處用乾盆子一隻燒脆
煙盡取出研令極細每服一錢溫酒調下不拘時候

薑魚丸

治同前

乾生薑

一兩末

右用鯽魚膽汁和丸如梧桐子大每服七丸米飲下
不拘時服之

水骨丸

治同前

湯瓶內水醱

一兩

右研為細末燒粟米飯和丸如梧桐子大每服十五丸人參湯下不拘時候服一方研如粉沸湯或井華水調服

治脬渴飲水過多小便不利方

蔡根葉

五兩切

右件藥以水三大盞入生薑一分豉一合煮取二盞去滓食後分溫三服

治脬渴飲水過多不瘥方

凌霄花

一兩

右搗碎以水一盞半煎至一盞去滓分三服

又方

人參

一兩去蘆頭
搗細羅為散

右用雞子清調下一錢日四五服

治瘡渴飲水無度小便多口乾渴

雉

一隻

右細切和鹽豉作羹食

治瘡渴煩燥飲水無度

七家井索

用近罐口結處燒為灰

右不拘時候以新汲水調服二錢不過三五服效

人參湯 治瘡渴發作有時心脾有熱飲水無度

人參 桑根白皮

剉炒各二兩

麥門冬

去心焙

知母

枇杷

杷葉

拭去毛炙

黃連

去須微炒

葛根

剉

白茯苓

去黑皮

地骨皮

一 淡竹葉 一兩

右剉如豆每服五錢用水一盞半煎至八分去滓溫

服

天花粉丸 治消渴飲水多身體瘦

天花粉

黃連

去須各一兩

茯苓

當歸

各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸茅根煎湯

下

黃連丸 治消渴飲水絕多身體黃瘦

黃連

半兩去須

黃丹

半兩炒令色紫

豆豉

半兩炒乾

右為末入黃丹研令勻用軟飯和丸如梧桐子大每

於食後以溫水下五十丸

枯樓丸

治瘡渴飲水絕多身體黃瘦

枯樓根

黃連

去

須鐵粉

細研已上
各等分

右為末入鐵粉研令勻煉蜜丸如梧桐子大不計時
煎茅根湯下二十九

治瘡渴飲水不知足

兔頭

一具

右以水煮取汁飲之

治消渴飲水多身體黃瘦

窰突上黑煤

結乾似鐵屎者半斤

右搗取末更以生薑四兩同搗絹袋盛以水五升浸

取汁不時候冷飲半合

蘭香飲子

一名甘露膏

治消渴飲水極甚善食而瘦自汗

大便結燥小便頻數

石膏 防風 生甘草

各一兩 知母 酒浸一錢半

半夏

二分

湯洗炙甘草 人參 蘭香 白豆寇仁 黃翅

桔梗 升麻

各半錢

右同為細末湯浸蒸餅和勻成劑捻作薄片子日中曝半乾碎如米每服二錢食後淡生薑湯送下

牛黃甘露丸 治三焦渴疾飲水無度舌上皴裂肌肉

黃瘦精神減退小便多腹脇脹

硃砂

一兩成塊者

牛黃

麝香

各一兩

鐵粉

梧桐律

犀角

剉

丁香

鉛白霜

姜蕤

地黃

知母

檳榔

麥門冬

去心

牡蠣

苦參

石膏

甘草

炙

錫蘭脂

白扁豆

各半兩
慢火炒

宣黃連

銀箔

五十片
生

枯樓根

一兩
細研

金箔

一百二十片
不用北地者

右除枯樓根別搗外同為細末煉蜜和丸臨和時即入金箔及生枯樓根一處和勻為丸如菀豆金箔三片銀箔二片碎研空心米飲下十九漸加二十九飯後臨卧各一眼日近輕者當日止重者三日二十日後只空心一眼夜一眼用金銀箔各一片一月外只用溫漿水下十五丸其藥合時二月至九月即用生

萆薢根九月後只用煉蜜為丸亦得忌鹹酸炙煨魚酒等

治暑月渴而飲水過多乾嘔復渴不思飲食

乾葛

一兩炮

甘草

一兩炙

陳粟米

二匙炒

右呖咀每服二錢水一盞煎至六分去滓食上溫服一日二三次

消渴飲水腹脹

附論

夫消渴飲水腹脹者由水氣流行在於脾得濕氣不能

消穀得過經絡否澁氣血行則水不得宣通停聚流溢於膀胱之間故令脹滿也脾土制水通調水道下輸於膀胱脬渴飲水過多內漬脾土土不制水故胃脹則為腹滿之疾也內經謂水為陰腹者至陰之所居是以水飲之證先見於腹滿

人參湯

一名木香湯又名桑白皮湯出聖惠方

治脬渴飲水過多心腹

脹滿不能食

人參

一兩去蘆頭

桑根白皮

半兩剉

黃耆

三分剉

陳橘皮

湯浸

去白 一兩 半夏

湯浸七遍
去滑半兩

木香

赤芍藥

草豆蔻

去皮

桂心

去粗皮

檳榔

剉

枇杷葉

去毛炙已
上各半兩

右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去

滓不計時候一方用枳殼無陳橘皮

人參湯

出聖濟
總錄

治瘡渴飲水過多心腹脹滿或脇肋

間痛腰腿沈重

人參

白芍藥

大腹子

兩枚慢灰
火內煨切

葛根

剉黃芩

去黑心

知母

焙

桑根白皮

剉

赤茯苓

去黑心各
一兩半

姜薤

一兩一分

枳殼

去瓢麩炒三分

右咬咀每服三錢水一盞入生薑如棗子大拍破煎

至七分去滓空心溫服食後夜卧任服

桂心湯散

出聖惠方

治痼渴飲水傷冷太過致脾氣虛腹

脇脹滿不思飲食

桂心

人參

去蘆頭

白茯苓

訶黎勒皮

甘草

炙微

赤枳殼

麩炒微黃去瓢

前胡

去蘆頭

白朮

大腹皮

剉各厚半兩

朴

一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每於食前溫服

赤茯苓湯

出聖惠方

治脬渴飲水太過胃氣不和不思飲

食宜服此

赤茯苓 人參

去蘆頭

赤芍藥

已上各半兩

白朮 檳榔

桂心 前胡

去蘆頭

厚朴

各三分去粗皮生薑汁塗炙香熟

枳殼

半兩麩炒微黃去瓢

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓每於食前溫服

陳橘皮散

出聖惠方

治瘡渴飲水過多心腹脹滿或脇肋

間痛腰腿沉重

陳橘皮

一兩去白

訶黎勒皮

赤茯苓

桂心

大腹

皮

剉

芎藭

枳殼

炒黃去瓤

赤芍藥

各半兩

甘草

一兩炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓食後溫服

半夏散

出聖惠方

治瘡渴飲水腹脹煩熱嘔吐不思飲食

半夏

半兩湯洗七遍去滑

赤茯苓

人參

各一兩去蘆頭

白木

三分

香

半兩

甘草

半兩炙微赤剉

陳橘皮

一兩湯浸去白焙

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分又竹茹一分同煎去滓不計時候溫服

檳榔湯

出聖惠方

治痢渴飲水不止小便澁心腹連膀胱

脹悶胸膈煩熱

檳榔

剉

桑根白皮

剉

赤茯苓

去黑皮

木通

剉

紫蘇莖

葉

麥門冬

去心焙各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞入生薑半分切葱白七寸煎至六分去滓不計時溫服

赤茯苓丸

出聖濟總錄

治久消渴小便數服止小便藥多

渴猶不止小便復澁兩肋連膀胱脹悶急妨心胸煩熱

赤茯苓

去黑皮

桑根白皮

剉

防風

麥門冬

去心焙各半兩

郁李仁

湯浸去皮焙乾研

木香

各一兩

右先搗前五味為細末與郁李仁研令勻煉蜜和為

劑更於石臼內酥杵令勻熟丸如梧桐子大每日空

腹煎木通棗湯下三十九至晚再漸加至五十九

旋覆花湯

出聖濟
總錄

治消渴腹脇虛脹心下滿悶

旋覆花

淨擇去莖
葉微炒

桑根白皮

剉

陳橘皮

湯浸去白
微炒各一

兩

紫蘇

并嫩莖
乾者

犀角

鎔各
半兩

赤茯苓

去黑皮
三分

右㕮咀每服七錢水三盞入棗三枚擘生薑半分拍

破鹽鼓半匙同煎至一盞半去滓分溫三服每食後

一服如人行五里已來更一服

大黃丸

出聖惠方

治痢渴腹脹利大小腸

川大黃

三兩剉碎微炒

桔樓根 檳榔

枳殼

麩炒去瓢微黃各一

兩

芎藭

二桂心三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以溫水下

三十九

麥門冬湯 治痢渴喉乾不可忍飲水不止腹滿急脹

麥門冬

去心焙

烏梅

去核取肉炒各二兩

右咬咀每服三錢水一中盞去滓食後溫服日三

桂苓甘露散 治飲水不消嘔吐瀉利流濕於注宣通
氣液水腫腹脹泄瀉不能止者兼治霍亂吐瀉下痢
赤白止煩渴解暑毒大有奇效兼利小水

桂心

去粗皮
半兩

白茯苓

猪苓

並去
皮

白朮

寒水石

別研
細

澤瀉


甘草

各一
兩

滑石

別研
二兩

右為細末或煎或水調二三錢任意服之或入蜜少
許亦得一方有石膏一兩無猪苓



普濟方卷一百七十九

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百八十

詳校官太醫院醫士_臣趙正池

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士_臣何思鈞

校對官典簿_臣劉景岳

謄錄監生_臣何延禮

欽定四庫全書

普濟方卷一百八十

明

周王朱橚撰

渴利

附論

夫渴利者飲隨小便是也由少服乳石及熱盛時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱熱則腎燥燥則渴蓋腎氣虛不能專制水液故飲隨小便也其病變多發癰疽以其內熱而小便故也小便利則津液竭津液竭則經絡澀經絡澀則榮衛不行而熱氣留滯故成癰疽也

前胡湯

出聖濟總錄

治瘡渴利有熱小便澀

前胡

去蘆頭

生乾地黄

焙

大黃

剉炒各一兩

黃芩

去黑心

梔

子仁

升麻

芍藥

桔樓根

石膏

碎各三分

麥門

冬

去心焙一分

桂心

去粗皮一分

枳實

去蘆麤炒

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半入生地黄一分切碎同

煎至八分去滓食前溫服日三

竹葉湯

出千金方

治渴利虛熱引飲不止消熱止渴

竹葉

切二升

地骨皮

生地黄

切各一升

桔樓根

石膏

各八分

茯神

一作茯苓

萎蕤

知母

生薑

各四兩

生麥門

冬一升

大棗三十枚

右咬咀水一斗二升煮取四升分四服

調中湯 治腎虛熱渴小便多除風濕理石毒止小便

去皮膚瘡

升麻

甘草

炙

菝葜

各四兩

元參

知母

漏蘆

各五

分

茯苓

三分

牡蠣

煨

枳實

炙

黃連

各六分

右為末飲汁服方寸匕日再服以瘡為度忌猪肉海

藻松菜酢物

竹葉散

出千金方

治下焦虛熱上炎肺胃渴飲而利

竹葉

切三升

甘草

三兩

桔樓根

生薑

各五兩

麥門冬

茯苓

各四兩

大棗

三十枚

小麥

地骨皮

各一升

右咬咀先以水三升煮小麥取一升去滓澄清取八升去

上沫取七升煮藥取三升分三服

石膏湯

出聖濟總錄

治渴利虛熱引飲不止消熱止渴

石膏

四兩

地骨皮

二兩

桔樓根

三兩半

茯苓

去木

知母

焙萎

麤各二兩

右咬咀每服四錢水二盞竹葉二十片生地黃半分切生薑三片棗二枚擘破同煎至一盞去滓溫服日

三

枸杞根飲

出聖濟總錄

治常食熱麵炙燂諸乾燥物及服

補熱藥因熱酒衝肺日久即患瘡渴飲水無度小便旋利心中熱悶煩燥

枸杞根皮 荻根 李根白皮 葛根

四味並洗切各二兩

甘草

炙一兩

牡蠣

炒二兩

石膏

碎五兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓不拘時

溫服

桔樓散 治腎虛熱渴小便利

桔樓

茯苓

各一分

元參

四分

枳實

炙六分

苦參粉

甘

草

炙橘皮各三分

右為末空腹以漿水服方寸匕日再服忌海藻犬酢

菰菜

地黄丸

出千金方

治面黃手足黃咽中乾燥氣短脈如連

珠除熱止渴利補養

生地黄

汁

生栝樓根

牛羊脂

三升

白蜜

四升

黃連

一斤

為末

右合煎令可丸如梧桐子大米飲服五九日二加至

二十九若苦冷而渴瘥即宜別服溫藥

麥門冬湯

出聖惠方

治渴利

麥門冬

去心焙

白茯苓

去黑皮各四兩

栝樓根

地骨皮

各五

兩甘草 炙三

兩

右咬咀每服四錢先以水二盞入小麥一匙竹葉二
七片生薑半分棗二大枚擘破同煎至一盞半去滓
下藥末煎八分食前去滓溫服三日

枸杞湯

出千金方

治渴而利者

枸杞枝葉

一斤

黃連

甘草

枯樓根

石膏

各三兩

右咬咀水一斗煮取三升分五服日三夜二劑者多
合渴即飲之

枯樓散

出千金方

治渴利日飲水數斗小便頻數

方見本門痛中

類

厚朴湯

出聖濟總錄

治三消渴飲水無度小便隨之肌肉

消瘦

人參

一兩 牡蠣

厚朴

去粗皮姜汁炙各三兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓不計時

候溫服

黃耆散

出聖濟總錄

治三消渴疾肌膚瘦弱飲水不休小

便不止

黃耆

剉

桑根白皮

剉細各一兩

葛根

剉二兩

右為散每服三錢搗猪湯澄清調下不拘時

石菖蒲散

出聖濟總錄

治渴日夜飲水隨飲即利

石菖蒲

一兩

桔樓根

二兩

黃連

去須半兩

右為散每服三錢新汲水調下食後臨卧服

桔樓根煎

出聖濟總錄

治渴利

生桔樓根

去皮細切十斤

黃牛脂

碎切一合半鍋內慢火煎令消蘆去滓

右先水三斗煮生枯樓根煎至一斗用生絹絞去滓
取汁納牛脂攪令勻再納鍋中慢火煎不住手攪令
水盡候如膏狀即止於瓷盒中密盛每日食後溫酒
和如雞子黃大服之日三服

雞肫脰

出聖濟
總錄

治渴利飲水下咽即利為膀胱有熱

名曰渴利一名雞內金丸

方見本門
腸須類

小豆汁

出聖濟
總錄

治渴利

小豆

不以
多少

右水煮熟搗爛細布絞取汁每服一盞不拘時頻服
即瘥

又方

出千金方

竹根

右濃煮汁飲之瘥止

又方

胡麻

右熬令變色研淘取汁飲半合日可三四服不過五

升即瘥

治小便卒太數復非淋一日數十過令人瘦

出肘後方

末中水猪脂

如雞子一枚

右多承取肥汁盡服之不過三劑即瘥

又方

羊肺

一具

右以作羹納少肉和鹽豉如食法任意進之不過三具瘥

又方

豉一

升

右納於鹽中綿裹之以白礬好者半斤置綿上令蒸之三斗米許時即下白礬得消入豉中出曝乾搗末每服方寸匕

拔毒飲

出聖濟總錄

治瘡渴小便數少

方見本門肺瘡類

鹿兔煎

出澹寮方

治三消渴利神藥常服禁遺精止白濁

延年

兔絲子 北五味子

各五兩

白茯苓

三兩半並如元兔丹法製度

鹿茸

一兩半鹽酒浸炙

右為末生地黄汁搜和為丸如梧桐子大每服五十

九空心鹽湯下

黃耆丸

出聖濟總錄

治消渴小便數少虛極羸瘦

黃耆

剉

鹿茸

去皮酥炙各二兩

牡蠣

煨一復時

土瓜根

黃連

去鬚

白茯苓

去黑皮各一兩

人參

一兩半

右搗羅為末研令細煉蜜為丸梧桐子大每服三十

丸用首烏湯下

地骨皮飲 治瘡渴日夜飲水不止小便利

地骨皮

剉

土瓜根

剉

栝樓根

剉

蘆根

剉各兩半

麥門冬

去心焙

棗

七枚

二兩

去核

右㕮咀每服四錢水一盞煎至八分去滓溫服不拘時

茯苓丸

出千金方

治渴小便數

貝母

六分一本作知母

茯苓

栝樓根

各四分

鉛丹

一分雞肫

脛中黃皮

十四枚

右細末飲服方寸七日三瘡後常服尤佳常服不絕

則去鉛丹以蜜丸之用麥飲下一方無貝母用貝齒

元兔丹

出三因方

治三消渴利神藥常服禁遺精止白濁

延年

兔絲子

酒浸通軟乘溫研焙乾別取末十四兩

白茯苓

三兩

五味子

酒浸

別為末
秤七兩

乾蓮肉

三兩

右為末別碾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮糊

搜和得所搗數千杵丸如梧桐子大每服五十九米
湯下空心食前服一方用天花粉五味子湯下溫酒
鹽湯亦可脚膝無力木瓜湯下

梅花湯

出三因方

治三消渴利神效

糯穀

旋炒作爆聲

桑根白皮

厚者切細等分

右用秤每一兩許水一大碗煮取半碗渴則飲下不

拘時

麥門冬湯

出衛生寶鑑

治消渴日夜飲水不止飲下小便即

利

麥門冬

去心
焙

黃連

去

須乾冬瓜

各二
兩

右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

疝腎小便白濁

附論

夫疝腎小便白濁如脂者此由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰陰為小便之道脬冷腎損故小便白而如脂或如麤片也疝渴飲水過多久則滲漏脂膏脫耗精液下流脬中與水液渾濁隨其小便利下膏

凝故謂之消渴小便白濁也

肉蓯蓉丸

出聖濟總錄

治消渴尿脂小便如泔

肉蓯蓉

去皺皮酒浸切焙

地骨皮

澤瀉

五味子

巴

戟天

去心

當歸

切焙各一兩

磁石

煨醋淬七遍

人參

赤石脂

各一兩半

韭子

炒

白龍骨

甘草

炙剉

牡丹皮

各一兩

熟乾

地黃

焙一兩

禹餘糧

煨三分

桑螵蛸

炙四一枚

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九以牛乳

下日三

黃耆九

出聖
惠方

治疝腎小便白濁四肢羸瘦漸至困乏

宜服

黃耆

剉

黃連

去
鬚

熟乾地黄

牡蠣

燒為
粉

鹿茸

去毛
茶酥

炙微黃
各一兩

白茯苓

土瓜根

龍骨

元參

五味

子

人參

去蘆
頭

桑螵蛸

微炒各
三兩

麥門冬

二兩去
心焙

菝葜

萸

半兩
剉

右為細末煉蜜和搗五七百杵九如梧桐子大每於

食前以清粥飲下三十九

辰砂妙香散 治渴證小便澀數而澀兼有油濁

茯苓

茯神

去木

山藥

炮

遠志

水浸去心焙

黃耆

各一兩

人

參

甘草

炙

桔梗

各半兩

木香

辰砂

別研各三錢

麝香

錢一

右為細末每服二錢加辰砂少許用茵陳煎湯調下
日三服或用燈草茯苓煎湯下

葶藶丸

出聖濟總錄

治脬渴下冷小便濃白如泔嘔逆不

下食

葶藶子

慢火炒別搗如膏一兩半

枳殼

去瓢麤炒

桂

去粗皮

羚羊角

銹

白茯苓

去黑皮

柴胡

去苗

鼈甲

去裙襴醋浸炙

防風

去皮

兔絲子

酒浸兩宿乾炒別搗

牛膝

去苗

安息香

各三分

陳橘皮

湯浸去白焙一兩

右為細末煉蜜和劑酥塗杵搗勻熟丸如梧桐子大每服三十九丸空腹酒下

黃耆散

出聖惠方

治消渴腎虛心神煩悶小便白濁

黃耆

剉

麥門冬

去心

茯苓

龍骨

枯樓根

熟乾

地黃

澤瀉

白石脂

桑螵蛸

微炒各一兩

甘草

三分

炙微

赤劉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓每於食前溫服

腎瀝湯

出聖濟總錄

治脬渴小便白濁如脂

白羊腎

一具去脂膜切

黃耆

劉

杜仲

劉炒

五味子

生薑

切各

一兩半

生乾地黄

焙一兩

人參

半兩

棗

五枚去核

磁石

三兩搗碎綿裹

右除羊腎磁石外剉碎分為二劑先水四升煎腎與磁石外二升去腎然後下諸藥再煎取八合去滓分

二服食前服

金牙石湯

出聖濟總錄

治消渴小便濃濁如麵汁此為腎

冷

金牙石

搗碎研

厚朴

去粗皮塗生薑汁炙熱

石菖蒲

各一兩半

貝母

研去心

烏梅

去核微炒

葶藶子

炒別搗如膏各三分

桂皮

去粗

高良

薑 兔絲子

酒浸兩宿曝乾後微炒別搗各半兩

右先搗八味為粗末次入金牙石再研勻每服三錢

水一盞入棗三枚去核煎七分去滓早晚食前溫服

銀錫丸

出神效方

治飲水百盃尚猶未足小便如油或如

杏色

水銀

四錢錫二錢用水銀研成砂子

牡蠣

蜜陀僧

知母

貝母

各一兩

黃丹

半兩

紫花苦參

枯樓根

右為細末男子用不生兒猪肚一箇納藥婦人用獐

肚一箇線縫之新瓦一合繩繫一兩遭米一升更用

枯樓根末半斤却於新水煮熟取出放冷用砂盆內

研爛就和為丸如猪肚丸法用之服此藥三五日小

便大出毒歸於下十日永除根本此方屢試屢驗真

妙劑也

黃連丸

出聖惠方

治脬腎小便滑數心神煩燥白濁

方見本門

痛中類

兔絲子散

出聖惠方

治脬腎小便多白濁或不禁

兔絲子

酒浸三日曝乾別搗為末

肉蓯蓉

酒浸一宿刮去皺皮炙乾

黃連

去

各一兩

磁石

半兩燒赤醋淬七遍碎研

蒲黃

一兩半微炒

雞肫腔中黃

皮

一兩半微炒

五味子

一兩

右為末入研了藥令勻每於食前以清粥飲調下二

錢

鹿茸丸

出聖惠方

治脬腎小便滑數白濁將欲沈困宜服

鹿茸

去毛塗酥炙微黃

肉蓯蓉

酒浸一宿刮去皺皮炙乾各一兩半

黃芩

土瓜根

人參

去蘆頭各三分

雞肫脰

十枚微炒

兔絲子

三兩酒浸

三日曝乾

別搗為末

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食

前以清粥飲下三十丸

山茱萸丸

出聖濟總錄

治消渴飲水極多肢體羸弱小便

如米泔腰膝冷通諸藥不能治者

土瓜根

劉

苦參

龍骨

細研各一兩半

山茱萸

枯樓根

劉各一兩半

右先搗五味次入龍骨再研勻用生枯樓汁和劑酥塗杵搗勻熟丸如梧桐子大每服三十九食後煎白

茅根飲下日三

遠志丸

出三因方

治心腎虛煩渴引飲胸間短氣小便自

利白濁泄遺

人參

白茯苓

川薑

炮各半兩

遠志

去心薑汁製炒

牡蠣

煨取

粉各

一兩

右為末用茯苓一兩酒熬成膏九如梧桐子大每服

五十九糯米湯下

桑螵蛸丸

出聖惠方

治脬腎小便白濁久不瘥

桑螵蛸

微炒

兔絲子

酒浸三日曝乾別搗為末

黃連

去鬚各一兩

熟乾

地黃

二分

山茱萸

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食

前煎大麥飲下三十丸

鐵粉丸

出聖惠方

治疳腎心肺熱極羸瘦乏力口乾心煩

小便如脂

鐵粉

一兩細研

生地黃

三兩

雞肫脰

三兩微炒

牡蠣

三兩燒為粉

黃連

一兩去

右為末入研了藥令勻煉蜜和搗三二百杵丸如梧

桐子大不計時候以粥飲下三十丸一方無生地黃

用乾地黄以酥塗杵熟為丸

鐵粉丸

出聖濟總錄

治消渴臟腑枯燥口乾引飲小便如

脂

鐵粉

研水飛過
乾秤再研

黃連

去鬚各
三兩

雞肫脰

陰乾五
枚炙熟

牡蠣

炒研如
麩二兩

右先搗二味為細末再與鐵粉牡蠣研勻煉蜜和劑
以酥塗杵熟搗丸如梧桐子大每服三十丸食前煎
粟米飲下漸加至四十九

天雄散

出聖惠方

治脬腎小便滑數白濁心神煩燥

白石脂

三分

露蜂窠

微炙

天雄

各半兩炮製去皮臍

右粗搗都以水二大盞半入棗五枚煎至一盞去滓

食前分溫三服

黃耆散

出聖惠方

治脬腎小便滑數白濁令人羸瘦宜服

五味子

黃耆

劉各半兩

雞臍脰

一兩微炙

右件粗搗都以水三盞煎至一盞半去滓食前溫三

服

黃連丸

出聖惠方

治瘡渴飲水不知休小便中如脂舌乾

口渴

黃連

去鬚

枯樓根

各三兩

右為末生地黄汁和劑石臼內用木杵酥塗搗勻熟
九如梧桐子大每服三十九食後牛乳下日二一方
以麥門冬研汁和丸熱水下

蠟苓丸

出危氏方

補虛治濁止渴潤腸婦人血海冷白帶

白淫白濁

黃蠟

雪白茯苓

去皮各四兩

右茯苓為末溶蠟和九彈子大每服一九不饑飽時細嚼下棗湯亦可

加減八味丸

出危氏方

治腎水枯竭不能上潤心火上炎

不能下濟煎熬而生心煩躁渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不多肌膚漸漸如削或腿腫脚先瘦小宜降心火生腎水其煩渴頓止

熟地黃

大者先焙乾切酒蒸七次焙乾稱二兩

真山藥

微炒一兩

山茱萸

去核取肉焙

肉桂

去粗皮忌見火取末半兩

澤瀉

水浸切酒洗潤蒸一次牡

乾秤一兩

丹皮

去骨

白茯苓

去皮為末飛過取沈者各八錢

真北五味子

畧炒別為

末一

兩

右為末煉蜜丸如梧桐子五更初莫言語時溫酒鹽湯下三十五十九午前及晚間空腹再服此方用真北五味子最為得力服此不惟止渴亦免生癰疽久服永除渴疾氣血加壯一日或先患癰疽纔覺作渴即當服此或有癰疽而無渴證亦宜以預防蓋患癰

之人多於欲發未發之際作渴而不可救患渴之人多患癰而命終故不可不服此藥也外科精要云有一貴人病疽疾未安而渴作諸醫盡用木瓜紫蘇烏梅人參茯苓百藥煎等生津止渴之藥服多而渴愈甚後用此方三日渴止又云一士大夫病渴療累歲不安一名醫使服此八味圓下半載而疾痊因疏其病源云今醫多用醒脾生津止渴之藥誤矣服此降其心火生其腎水則渴自止矣

磁石湯

一名腎瀝湯
出聖濟總錄

治痛腎小便白濁如凝脂形體

羸瘦

磁石

六兩別搗如米粒分為二十貼每用煎時取一貼綿裹

黃耆

細剉

人參

五味子

各一兩半

杜仲

去粗皮炙剉

熟地黄

乾焙各二兩

右除磁石外粗搗篩分為二十貼先用水三盞羊腎

一隻切作四片去筋膜與磁石一貼同煎至二盞去

磁石羊腎下藥末更同煎至一盞半去滓溫服兩服

之

茯苓丹

一名元兔丹

治三消渴通用亦治白濁

方見本門渴利類

治白濁不問老少深者或有夜夢走洩遺瀝澀痛或

赤或白皆酒色過度上盛下虛心火上炎肺金受克

口舌乾燥漸成瘡渴睡卧不安四肢倦怠男子赤白

濁婦人赤白帶下五心熱燥不問老少遠年近日先

服此藥一月

出鄭氏家傳濁渴方

人參

黃耆

蓮肉

去心

茯苓

白茯苓

麥門冬

北五味

各一兩

甘草

黃芩

地骨皮

車前子

各半

兩

右咬咀每服二錢白水煎又加五苓散去桂名百段

錦散

又方 此藥去根不可連用服盡前藥方可用此

出鄭氏家

傳渴
濁方

人參 茯苓 枯白礬 白龍骨 遠志 去心 黃耆

各一兩 龍齒 雞頭子 帶殼 家韭子 炒 老松糖 溶 五味

子 牡蠣 煨各二兩 木香 沈香 各半兩 桑螵蛸 鹽水炒半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心鹽湯

下

兼服後藥

桔梗

炒

薏苡仁

炒

乾葛

人參

白茯苓

蓮肉

去心各一兩

白朮

甘草

白扁豆

炒

黃耆

蜜炙

當歸

各半

兩

桑白皮

麥門冬

去心

半夏麴

百合

乾薑

炮

山藥

炒

五味子

杏仁

去皮尖

木香

丁香

白芷

神麴

各一兩

右呔咀每服二錢薑三片棗一枚煎至七分空心服
治濁

白茯苓 老松皮 雞頭子 蓮肉

各等分

右為細末用金櫻膏為丸每服三十九鹽湯或酒任
下

又方

人參 白茯苓 花龍骨 牡蠣 胡桃肉

各等分

右為細末煮羊腎為丸每服三十九鹽湯或酒任下

大凡瘠渴之證皆由腎氣虛敗肺主氣而心主血血枯
脈燥心火上炎腎水下流乃至天在上而地在下以為
否卦今水火不升降若服冷藥一時快意其慮愈甚水
愈竭而火愈大火壅結燥若不成癰則津液枯而衰弱
遂成難理之疾此證方書甚多要不得泥執在人活用
之

水陸二仙丹 大治男子夢遺白濁腰膝酸疼

雞頭子

和殼
為末

右用金櫻膏為丸如梧桐子大空心鹽湯下二十九
孫氏存仁方金櫻同為末用酒糊丸又云男子用乳
汁丸尤妙

補方定心志安神除煩

人參 琥珀 麥門冬去心 黃耆 蓮肉 當歸

鹿茸各一兩 肉蓯蓉 白茯苓 遠志 犀角鎊 沈

香 硃砂各五錢 木香一錢

右為末空心鹽酒湯調下

支感丹

出鄭氏家傳渴濁方

治白濁遺精

兔絲子

酒炙

白茯苓

各五錢

秋石

一兩

右為末百沸湯一盞井花水一盞為陰陽和煮糊為

丸鹽酒湯下

金鎖丹

出鄭氏家傳渴濁方

治白濁

白茯苓

茯神

各二兩

遠志

一兩炒去心

牡蠣

四兩炒

五花

龍骨

一兩半

右為末糯米丸空心鹽湯下

羊腎丸

出鄭氏家傳渴濁方

治白濁妙甚第三隻用本事云申

酉時腎開宜進此藥

大雞頭

二兩一分

家韭子

牡蠣

煨各二兩

半夏

木猪苓

赤者同半夏

炒每各三兩

右為末爛煮羊腎去膜同藥末為丸如梧桐子大八

麝香一錢或硃砂為衣瓦器盛之每服二十粒煎猪

苓湯吞下

治赤白濁

出鄭氏家傳渴濁方

人參 黃耆 茯苓 龍骨 白石脂 煨牡蠣 各

一 枯樓根 桑螵蛸 各半
兩

右為末糊丸如梧桐子大每服三十九鹽湯下

治白濁小便頻數夢遺不禁
出鄭氏家傳渴濁方

牡蠣 龍骨 白礬 白茯苓 秋石 人參

黃耆 各一
兩

右為末糊丸如梧桐子大每服三十九空心鹽酒湯

下

治元陽虛極小便如脂

出鄭氏家傳渴濁方

蒼朮

茴香

川烏

川楝子

川椒

龍齒

牡蠣

破故紙

各一兩同炒赤

右為末糊為丸空心鹽湯下每服三四十丸

治白濁

出鄭氏家傳渴濁方

兔絲子

酒煮一日焙乾

巴戟

去心酒浸煮

破故紙

炒

鹿茸

山

藥

赤石脂

五味子

各一兩

右為末酒糊丸空心鹽湯下

又方

出鄭氏家
傳渴濁方

石菖蒲

甘草

炙各半兩

人參

當歸

赤茯苓

五

味子

紫苑

去蘆

栢子

酸棗仁

各一兩

橘紅

川芎

細辛

麥門冬

去心各半兩

右咬咀每服入蜜一匙同煎至七分不拘時溫服

三搏丸

出鄭氏家
傳渴濁方

人參

五味子

黃耆

蜜炙各一兩

白礬

龍骨

五

倍子

嬰粟殼

川楝子

炒

茴香

牡礪

煨

熟地

黃澤瀉

牡丹皮

木鱉子

各半兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九鹽湯酒任下

補骨脂丸

同前方

治夢遺

益智仁

二兩去殼青鹽五錢炒

川巴戟

一兩去心

補骨脂

一兩淨洗

龍

骨

一兩火煨

右為末羯羊腎子去膜并硬心子細切入丸盆內煮

爛如泥量入藥末搜和盆內杵百下丸如梧桐子大

每服百丸鹽米湯下

凡渴濁必先看為何證有濁無渴先服百段錦散後用
白羊腎丸及沈苓丸如有渴先須治渴先用三神湯既
減却與之議定方可沈香散次用珍珠丸除其渴白羊
腎丸除其濁方可用龍鳳丸斷其根

百段錦散

出鄭氏家
傳渴濁方

五苓散 清心蓮子飲

右二方依方製等分打合赤濁則除肉桂用生薑蓮
子同煎每日二服此藥常服不害

白羊腎丸

出鄭氏家
傳渴濁方

半夏

猪苓

各二
兩

右將半夏淨洗同剉猪苓同炒褐色為度却用半夏
為末煮酒羊肉外腎研爛同杵為丸却猪苓為末入
磁瓶內養每五七十九溫水服或猪皮煎溫湯空心

下

沈苓丸

出鄭氏家
傳渴濁方

白茯苓

半斤去
皮淨

猪苓

五
兩

右將茯苓剉成大塊猪苓為皮片瓦器用煮以猪苓
沈為度取白茯苓以蠟丸如彈子大每服用小瓦瓶
煮清粥候沸却下一丸攪勻空噉服

沈香散

出鄭氏家傳渴濁方
方見本門痢渴類

珍珠丸

出鄭氏家
傳渴濁方

生珍珠

一兩

麝香

龍腦

人參

天花粉

乾葛

白茯苓

甘草

紫草

各一兩

硃砂

黃連

各半兩

右為末酒糊丸如雞頭子大每服用麥門冬湯細嚼

咽下含化為妙

渴濁藥味總括

出鄭氏家傳渴濁方

牡蠣

用紙色定用鹽拌黃泥固濟大火煨過紅後令取出泥鋤底約一尺埋三宿却取研入

家韭子

焙乾

大半夏

用沸湯泡七次或煮復時取出合半生熟大者切作三片用猪

苓炒赤色去猪苓用

雞頭子

水淘去泥沙鍋裏以紙色入土埋三宿用

若多酒煮乾收起其餘諸藥只依本法

羊腎丸只要麝香為衣不用

硃砂亦可

大凡渴濁先用秘傳降氣數服用清心蓮子飲服一月

却兼服羊腎丸及八味丸之屬凡治此病動取二月三月甚者半年凡渴濁俱有者八味丸玉真丹和服

五味子丸

出經驗良方

治稟賦弱小便數亦不禁

五味子

四兩

熟地黄

六兩

肉蓯蓉

八兩

兔絲子

酒浸蒸二兩

右為末酒煮山藥末為糊丸如梧桐子大每服二三

十九米飲送下

消渴後成水病

附論

夫脾土也土氣弱則不能治水消渴飲水過度脾土受

濕而不能有所制則泛溢妄行於皮膚肌肉之間聚為浮腫脹滿而成水也五臟六腑皆有津液若臟腑因虛實而生熱者熱氣在內則津液竭少故渴也夫渴數飲其人必眩背寒而嘔者因利虛故也診其脈心脈滑甚為善渴其人久病變或發癰疽或為水病也

紫蘇湯

出聖惠方

治消渴後偏身浮腫心膈不利

紫蘇莖葉

桑根白皮

剉

赤茯苓

去黑皮各一兩

羚羊角

錫檳榔

剉各三分

木香

桂心

去粗皮

獨活

去蘆頭

枳殼

去穢

麩炒各
郁李仁
湯浸去皮
半兩
尖炒二兩

右咬咀每服四錢水一盞生薑半分切煎至八分去滓溫服不拘時

赤茯苓湯
出聖
惠方
治痼渴後頭面脚膝浮腫胃虛不能

下食心胃不利或吐逆

赤茯苓
去黑
皮
紫蘇子
白朮
前胡
去蘆
頭
人參
各一

兩
陳橘皮
湯浸去
白焙
桂心
去粗
皮
木香
檳榔
剉各
三分
甘

草
剉炙
半兩

右咬咀每服三錢水一盞半生薑半分拍碎棗二枚
擘破煎至一盞去滓溫服不拘時

防己丸

出聖
惠方

治瘡渴瘡後津液枯竭身體虛浮欲成

水病

防己

猪苓

去黑
皮

郁李仁

湯浸去
皮尖炒

杏仁

去皮尖雙
仁炒各一

兩

桔樓根

赤茯苓

去黑
皮

葶藶

紙上
炒

桑根白皮

剉
各

二

白朮

三分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸空腹漿

水下但服腫消小便快為度

藿麥湯

出聖濟總錄

治瘠渴欲成水氣面目并膝脛浮腫

小便不利

瞿麥穗

滑石

澤瀉

各半兩

防已

三分黃芩

去黑心一分

桑螵蛸

炒十枚

大黃

剉炒二分

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓空心溫服

良久再服

猪苓散

出聖惠方

治瘠渴後四肢浮腫小便不利漸成水

病

猪苓

去黑皮

人參

各三分

木通

剉一兩一分

黃連

去須一兩半

麥

門冬

去心焙

枯樓根

右為細末每服一錢溫漿水調下日三以瘥為度

茯苓散

出聖惠方

治消渴後數飲嘔逆虛羸欲成水病

赤茯苓

去黑皮

枯樓根

麥門冬

去心焙各一兩半

升麻

一兩

桑根白皮

剉二兩

陳橘皮

湯浸去白焙三分

右為細散每服一錢清水調下日再

葶藶丸

出聖惠方

治消渴後成水病浮腫

甜葶藶

一兩隔紙炒令紫色

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃一兩

枯樓子

一兩漢防己

一兩

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服煎赤猪苓湯下三十九日三四服

蘿蘆散

出聖惠方

治消渴後變成水病令作小便出

蘿蘆子

三兩炒令黃

紫蘇子

三兩微炒

右為細散每服煎桑根白皮湯調下二錢日三四服

瘠渴後虛乏 附論

夫久病瘠渴之人榮衛不足筋骨羸劣肌膚瘦瘁故病雖瘠而氣血未復乃為虛乏又有緣少服乳石而瘠渴者病後津液虛竭經絡否澁亦令虛乏須防癰疽之變救治之法所不可忽

黃耆丸

出聖惠方

治大渴後上焦煩熱不退下元虛乏羸

瘦無力小便白濁飯食漸少

黃耆

剉

肉蓯蓉

酒浸一宿刮去綿皮炙冷乾

鹿茸

去毛塗酥炙微黃各一兩

人參去蘆頭 枸杞子 白茯苓 澤瀉 附子炮製去皮

臍禹餘糧燒醋淬三遍細研 巴戟 桂心 牡丹皮 五

味子 龍骨 赤石脂各三分 熟地黄二兩 甘草兩

炙微赤對 地骨兩 磁石一兩半燒赤淬七遍搗碎細研 麥門冬二兩去心焙

牡蠣三分燒為粉

右為末令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三十九食前用清粥飲下

地黄生薑煎出聖濟總錄 治消渴後四肢羸弱氣虛乏

生薑汁一升 生地黃汁五升 蜜二斤綿 生麥門冬汁三升

牛脛骨內髓一升 茯神去木 甘草炙 石斛去根 黃連去須 各四

兩 枯樓根五兩 五味子微炒 知母炒 人參 當歸切炒

丹參各二兩 肉蓯蓉酒浸切焙三兩除前五味子 地

骨皮劉二升 胡麻仁二升 萎蕤劉五兩 生竹根劉三兩

右先水一斛五升煮地骨皮等四味至水四升絞去

滓下麥門冬地黃汁再煎五六沸却下蜜髓薑汁再

煎至七升為膏稀稠得所入前件藥味和為丸如梧

桐子大不拘時竹葉湯下三十丸

茯苓丸

出聖惠方

治消渴後氣乏體羸腿脛細瘦

肉茯苓

酒浸切焙

黃耆

剉

牛膝

去苗酒浸切焙

車前子

革薺

白茯苓

去黑皮

地骨皮

黃連

去須

檳榔

煨各一兩半

山芋

兔絲子

酒浸別搗

蒺藜子

炒去角

人參

白芍藥

各一分

澤瀉

桑螵蛸

炒各一兩

枳殼

去瓤麩炒三分

生乾地黃

炒二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心粟米

飲下

填骨煎

出千金方

治瘡渴後虛乏

白茯苓

去黑皮

兔絲子

酒浸焙別搗

山茱萸

當歸

切焙各二

兩肉蓯蓉

三兩酒浸切焙

大豆

炒去皮三合

石韋

去毛一兩三分

牛膝

酒浸切焙

巴戟天

去心

麥門冬

去心三兩三分

五味子

人參

遠志

去心各桂去粗皮一兩三分

附子

炮製去皮臍

石斛

去根各三

兩半作

石膏

右為末用生地黄生枯樓根各三斤搗取絞汁以銀石器慢火煎減半然後納藥并下白蜜十兩牛髓五

兩再煎令如糜九如雞子黃大米飲下日三藥末

不必盡入惟看稀稠得所甚佳一方無遠志

肉蓯蓉散

出聖惠方

治大渴後下元虛乏日漸羸瘦四肢

無力不思飲食

肉蓯蓉

酒浸一宿刮去縹皮炙令乾

麥門冬

去心

白石英

細研

黃耆

劉牡蠣

燒為粉

磁石

搗碎水淘去赤汁各一兩

熟乾地黄

二分

白茯苓

苓

牛膝

去苗

附子

炮製去皮臍

五味子

人參

去蘆頭

續

斷

各三分

白芍藥

桂心

萆薢

劉

地骨皮

各半兩

右為散每服用豬腎一節切去脂膜先以水一大
盞半煎至一盞去滓入藥五錢生薑二分韭白三節
煎至五分去滓每於食後溫服

鍾乳丸

出聖濟
總錄

治瘠渴後虛乏

鍊成鍾乳粉

續斷 熟乾地黄

焙

石韋

去毛

山茱

萸 蛇床子

甘草

剉

牛膝

酒浸切焙
各一兩

杜仲

去粗皮剉

炒三兩
三分

天雄

炮製去皮
臍半兩

遠志

去心一兩
兩三分

肉苁蓉

酒浸切焙

防風

去義

石斛

去根

赤石脂

各一兩
三分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九溫酒下

茯神煮散

出千金方

治虛熱四肢羸乏渴熱不止瘡渴補

虛

茯神 姜薤

各四兩

生石斛

黃連

枯樓根

丹參

各五兩

甘草

炙

五味子

知母

人參

當歸

切焙各

三分

大麥蘖

炒七分合半

肉苁蓉

去皮切細酒浸三日取出焙乾秤四兩

右件咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前

溫服

磁石散

出聖惠方

治大渴後虛乏羸瘦小便白濁口舌乾

燥不思飲食

磁石

二兩半搗碎水淘去赤汁

熟乾地黄

二兩

麥門冬

一兩去心

桑螵

蛸

三分微炒

黃耆

三分剉

人參

三分去蘆頭

桂心

三分

白茯苓

三分

五味子

三分

甘草

一分炙微赤剉

龍骨

三分

草薢

半兩剉

右為散每服用獾猪腎一節切去脂膜以水二大盞

煎至一盞去滓入藥五錢生薑半分去滓溫服晚食

前再服

石斛散

出千金方

治大渴後虛乏脚弱小便數

石斛

去根剉

肉蓯蓉

酒浸刮去縹皮炙乾各一兩

麥門冬

二兩去心焙

白茯苓

半兩微炒去刺

甘草

半兩炙微赤剉

乾薑

三分炮製剉

桂心

半兩

熟乾地黄

三兩續斷一兩

黃耆

三分剉

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前溫

服

鹿茸丸

出聖惠方

治大渴後虛乏小便滑數腿脛無力日

漸羸瘦

鹿茸

去毛塗酥灸令乾

肉蓯蓉

酒浸一宿刮去鱗皮炙乾

桑螵蛸

微炒各三

兩

附子

炮製去皮臍去

五味子

白龍骨

白蒺藜

微炙去刺

各一兩

黃耆

剉

石斛

去根剉

兔絲子

酒浸三日曝乾別搗為末各一兩半

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服三十丸空心及晚食前清粥飲下

白朮散

出危氏方

治胃虛發渴

白朮

一人參

白茯苓

右為末每服七錢水一盞半煎至七分服久渴之後

多有腫疾仍頻服復元丹數服

鉛丹散

一名廣連散

治消渴羸瘦小便不禁

方見本門久渴類

牛膝丸

出十便良方

治消渴不止下元虛損腎經竭

牛膝

酒浸切焙五兩

生地黄汁

五兩

右牛膝為末入地黃汁夜浸晝復浸汁盡為度煉蜜

丸如梧桐子大空心溫酒下三十九丸久服壯筋骨駐

顏黑髮

渴利後成癰疽

附論

夫渴利者為隨飲即小便也由少時服乳石乳石熱盛房室過多致令腎氣虛耗下焦生熱則腎燥則渴也今腎氣已虛又不得制於水液故隨飲即小便也以其病變但發癰疽以其內熱故小便利小便利則津液竭津液竭則經絡澁經絡澁則榮衛不行而熱氣留滯故成癰疽也強中之病者莖常興盛不交精液自出也痛渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服猪腎薤菖湯制腎中石熱也又宜服白鴨通湯

磁石丸

出聖濟總錄

治瘡渴內虛熱結成癰疽

磁石

火炮醋淬二七遍

甘草

炙對知母焙

黃芩

去黑心

枯樓根

各一兩

大豆

二合

石膏

碎一兩一分

薺芩

洗切

人參

赤茯苓

去黑皮

葛根

剉各三分

右為細末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九溫水送

下日三服

藍葉散

出聖惠方

治渴利口乾煩熱背生癰疽赤炊疼痛

藍葉

川升麻

麥門冬

去心

赤芍藥

元參

黃

者劉甘草

生劉

犀角屑

沈香

葛根

各一兩

川大黃

劉碎微

炒二兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時候溫服

射干散

出聖惠方

治渴利熱盛背生癰疽煩熱肢節疼痛

射干

川升麻

犀角屑

藍葉

黃芩

沈香

地榆

劉

川大黃

劉碎微炒各一兩

枯樓根

川朴硝

各二兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時溫服

元參散

出聖
惠方

治渴利煩熱發癰疽發背焮腫疼痛

元參

犀角屑

川芒硝

黃耆

沈香

木香

羚羊角屑

各三
兩

川大黃

二兩碎
剉微炒

甘草

三分
剉

右為散每服二錢不計時候以溫水調下

八珍散

出聖
惠方

治瘡渴後煩熱結成癰疽赤焮疼痛心

內煩不得眠臥

水銀

入鉛丹點少
水研令星盡

枯樓根

各一
兩

苦參

剉

知母

焙各
一兩

半鉛丹 兩蜜陀僧 研牡蠣 煨黃連 去鬚各一兩

右除水銀鉛丹外搗為散入水銀鉛丹末和勻每服

一錢溫水調下不拘時

石膏湯

出聖濟總錄

治瘡渴後成癰疽

石膏

碎一兩半

知母

焙一兩半

犀角

鎔屑一兩

枯樓根

生者剉去皮細可半

斤爛研生布絞取汁合半

兩如無炒乾者四兩代之

升麻

三分

土瓜根

絞取汁兩合半

無生者以乾

者四兩代之

右除汁外粗搗每服三錢二藥汁各半合水一盞半

小麥少許同煎至六分去滓溫服不拘時

麥門冬湯

出聖濟總錄

治痼渴後熱毒結成癰疽

麥門冬

去心焙

赤茯苓

去黑皮

枯樓

焙

地骨皮

洗切各二兩

甘草

剉炙二兩

右件咬咀每服三錢水一盞煎至七分濾去滓溫服

不拘時

白茅根飲子

一名茅根飲出聖惠方

治因服硫黃及諸丹石熱

發關節毒氣不得宣通肺燥熱渴利不止及發癰疽

發背

白茅根

一握對

桑根白皮

對

麥門冬

去心

紅雪

各三兩

赤

茯苓

三兩一作白茯苓

露蜂房

一兩炙黃

右細剉每服半兩水一大盞入淡竹葉三七片煎至

五分去滓溫服不拘時候一方無紅雪有棗二枚

鉛霜散

出聖惠方

治渴利煩熱背生癰疽赤炊疼痛心煩

不得眠卧服此

鉛霜膩粉

柳絮礬

川朴硝

各一分

右為細末每服以冷水調下半錢日夜可四五服

忍冬丸

出危氏方

治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草

不以多少根莖花葉皆可用一名老公鬚
蜜吸花一名金銀花古纏藤以洗淨用之

右用米麴酒於瓶內以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許為末即以所浸酒為糊丸如梧桐子大每服五十九至百丸酒飲任下不拘時一方用忍冬花煎服此藤凌冬不凋二月間花開五出黃白相間微香蒂帶紅又名金銀花老公鬚數名外科精要又以煮

酒甞服取時不犯鐵器服至大小腸通利此藥到得
力用乾者不及生者效速仍治五腫飛尸酒研傳瘡
亦好但留一口泄毒氣真經效奇藥也不特治癰亦
能止渴并五痔諸漏

磁石飲

出聖濟
總錄

治瘡渴後成癰疽亦治瘡腎渴燥

磁石

性緊者
四兩

右用杵碎以五升瓷器中煮取四升候冷不拘多少
飲之

枯樓根丸

出聖濟總錄

治痲渴後虛熱留滯結成癰疽

一名

葛根丸方見
飲水過度類

耆參五味湯

出如
宜方

治腎水枯竭不能運上痲渴恐生

癰疽

人參 五味子

粉草

炙

麥門冬

黃耆

各等分

右咬咀每服五錢用水一盞半煎至一盞入硃砂少許去滓溫服不拘時候輕則宜服黃耆六一湯

渴利後發瘡

附論

夫渴利之病隨飲即小便也此謂服石藥之人房室過度腎氣虛耗故也下焦既虛虛則生熱熱則腎燥腎燥則渴則飲水腎氣既虛又不能制水故小便利也其渴利雖瘥熱猶未盡發於皮膚先有風濕風濕相搏所以生瘡也

升麻散

出聖惠方

治渴利後皮膚生瘡肢節疼痛

川升麻

元參

知母

赤茯苓

漏蘆

枳殼

麝炒微黃去瓢

拔薤

甘草

各二兩

赤芍藥

三黃連一兩

半去

鬚

右為細末不計時候以溫漿水調下二錢以瘡為度

黃耆散

出聖
惠方

治渴利皮膚生熱毒瘡疼痛寒熱口乾

心煩

黃耆 甘草 川升麻 前胡 去蘆頭 桔樓根 知

母 麥門冬

去心

赤芍藥

各一兩

黃芩

生地黃

各三兩

右為散每服四錢水一盞入竹葉二七片小麥一百

粒煎至六分去滓不計時候溫服日三四服

皂莢煎圓

出聖惠方

治渴利後熱毒未解心神煩熱皮膚

瘙痒成瘡

皂莢

十挺不蛀者拍碎用水二升浸一宿冷濃瀝去滓以慢火熬成膏

麥門冬

一兩

去心

烏蛇

三兩酒浸去皮骨炙令微黃

枳殼

麩炒微黃去瓢

白蒺藜

微炒

去刺

防風

去蘆頭

川大黃

劉碎微炒

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒黃

苦參

劉

川升麻

各一兩

右為細末入皂莢膏和搗三二百杵丸如梧桐子大

每服食後溫漿水下三十丸

元參散

出聖
惠方

治渴利後頭面身上徧生熱毒瘡

元參

黃芩

川升麻

連翹

歲莖

各一
兩

犀角

屑

木香

白斂

各半
兩

梔子仁

三
分

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服日

三四服

秦朮丸

出聖
惠方

治渴利後肺臟風毒外攻皮膚生瘡癰

痒心煩

烏蛇

三兩酒浸去
皮骨炙微黃

秦朮

去
苗

枳殼

麩炒微
黃去瓢

赤茯苓

苦參

剉各
一兩

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服

三十丸煎竹葉湯下食後

枯樓根散

出聖
惠方

治渴利後心煩體熱皮膚生瘡癢痒

枯樓根

赤茯苓

各一兩

元參

枳殼

麩炒微黃去
瓢各一兩

甘草

炙微
赤剉

苦參

剉各
三分

右為細末每服一錢不計時候溫漿水調下

黃耆六一湯

出醫
大成

治男子婦人諸虛不足胸中發悸

時常痛渴或先渴而欲發瘡或病癰疽者並宜服之

黃耆

去蘆蜜塗
炙六兩

甘草

炙一兩

右咬咀每服三錢水一盞棗一枚煎至七分溫服不
拘時



普濟方卷一百八十